

# Vacunas recomendadas en 2023 para niños desde el nacimiento hasta los 23 meses

VACUNA	NACIMIENTO	1 MES	2 MESES	4 MESES	6 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	19-23 MESES
<b>Vacuna HepB</b> Hepatitis B	HepB	HepB			HepB				
<b>Vacuna RV*</b> Rotavirus			RV	RV	RV*				
<b>Vacuna DTaP</b> Difteria, tosferina y tétanos			DTaP	DTaP	DTaP		DTaP		
<b>Vacuna contra Hib*</b> Haemophilus influenzae tipo b			Hib	Hib	Hib *	Hib			
<b>Vacuna PCV13, PCV15</b> Enfermedad neumocócica			PCV	PCV	PCV	PCV			
<b>Vacuna IPV</b> Poliomielitis			IPV	IPV	IPV				
<b>Vacuna contra el COVID-19**</b> coronavirus					COVID-19 **				
<b>Vacuna contra la influenza<sup>†</sup></b> Influenza (gripe)					Influenza (una o dos dosis al año) <sup>†</sup>				
<b>Vacuna MMR</b> Sarampión, paperas y rubéola						MMR			
<b>Vacuna contra la varicela</b> Varicela						Varicella			
<b>Vacuna HepA<sup>‡</sup></b> Hepatitis A						HepA <sup>‡</sup>		HepA <sup>‡</sup>	

## NOTAS A PIE DE PÁGINA

RV\*

La administración de una tercera dosis a los 6 meses de edad depende de la marca de la vacuna contra Hib o el rotavirus usada para la dosis anterior.

Hib\*

COVID-19\*\*

La cantidad de vacunas recomendadas depende de la edad de su hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

Flu<sup>†</sup>

Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad.

HepA<sup>‡</sup>

Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para que brinde protección duradera. Las 2 dosis deben administrarse entre los 12 y 23 meses de edad. Debe haber un intervalo de por lo menos 6 meses entre la administración de cada dosis. Los niños de 2 años o más que no hayan recibido 2 dosis de la vacuna HepA deben completar la serie.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Si su hijo se perdió una vacuna recomendada para su edad, hable con su médico lo antes posible para ver cuándo se la pueden administrar.

2. Si su hijo tiene una afección que lo pone en riesgo de infección (p. ej., enfermedad de células falciformes, infección por el VIH, implantes cocleares) o va a viajar afuera de los Estados Unidos, hable con su médico sobre las vacunas adicionales que podría necesitar.

**Hable con el médico de su hijo si tiene preguntas sobre cualquiera de las vacunas recomendadas para su hijo.**